

知っておきたい
性感染症mini講座

愛され女子の 「しない」宣言

感染

政府インターネットテレビ

「身近なことです 性感染症～大切な人を感染させないためにあなたができること」

<http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7565.html>

厚生労働省 性感染症

検索

全国の保健所で相談が可能です(無料)

自分を守ればパートナーも守れる!

女子が知りたい「性感染症」

フェラなら
大丈夫でしょ


妊娠しないセックスだからと言っ
こうくうせいこう
て口腔性交(オーラルセックス)

をする人がいるようです。オーラルセックスで感染する性
りんぎん
感染症には淋菌感染症、クラミジア感染症などがありま
ちつせいこう こうくうせいこう せい
す。膣性交ではなく口腔性交(オーラルセックス)でも性
こうい
行為であることに変わりありません。

検査って高そうだけど

性感染症の検査費用はどこで


受けるかによって変わります。検査できる病気に制
限はありますが、保健所では無料で検査を受ける
ことができます。病院やクリニックなどは、診察代、
検査費用、初診料などがかかり、1項目の検査費
用はおよそ2,000円から4,000円ほど。健康保険を
使えば、初診料を除き費用は3分の1になります。



子どもが産めなくなるのは やっぱりショック

子どもができない

不妊症になりやすい性感染症は、性器クラミジア感染症や淋菌感染症りんきんなどです。これらの病気は女性だと自覚症状があらわれにくいので、気がつかないうちに病気が進行することもあります。そうになると妊娠しづらくなったり、子宮外妊娠や流産などにつながったりすることもありますから、早めにみつけて治療することが大切ですよ。




なってたら恥ずかしいから パートナーには話しにくい

あなたが性感染症にかかっていたら、パートナーもかかっている可能性があります。パートナーと同時に完治しないと、お互いうつし合い続けることになるので、思い切って話をする方が安心しますよ。

性器クラミジアや淋病りんびょうの患者は 若者に多いんだよ

■ 年代別にみた性感染症患者数の割合（総数）



□ 10歳未満 ■ 10代 ■ 20代 ■ 30代 ■ 40代以上

資料：「感染症発生動向調査（平成23年）」

自覚症状のない性感染症もあるよ

不妊症になったり、赤ちゃんにうつったりすることもあるよ

■ 知っておきたい性感染症の特徴的な症状

性感染症の症状はいろいろで、中には目立った症状がないものもあります。

男性

女性

性器クラミジア感染症

- おしっこをした時の軽い痛み
- 尿道からうみが出たり、かゆくなる
- 症状のある人は半分くらい
- 不妊の原因になることもある

- 症状はほとんどない
(初期のおりものや軽い下腹部の痛み程度)
- 進行すると不正出血や性交した時は痛みがある
- 不妊の原因になったり、妊娠中だと早期流産になることもある

淋菌感染症

- おしっこをした時の激しい痛み
- 尿道からやや黄色い白みがかつたうみが出る
- 精巣のあたりが腫れて熱が出る
- 不妊の原因になることもある

- 症状はほとんどない
(初期におりものが增える、熱が出る、下腹部の痛みが出る程度)
- 不妊の原因になることもある

尖圭コンジローマ

- 亀頭や陰のう、肛門のまわりに薄ピンク色のイボができる

- 外陰部、膣、肛門のまわりに薄ピンク色のイボができる

- 男性女性共に、イボの数が増え鶏のとさかのようなになる
- 自覚症状はほとんどない(かゆみや軽い痛みを感じる程度)

性器ヘルペス

- 性器にかゆみのある1ミリから2ミリほどの水疱ができる
- 太ももやリンパ節に腫れや痛みがあり、尿道分泌物が出る

- 大陰唇や小陰唇から、膣前庭部、会陰部にかけて水疱や潰瘍ができる
- 太もものリンパ節の腫れや痛みがあり、子宮頸管や膀胱まで感染が広がることもある

性感染症は、性器だけでなく、口や肛門からもうつるんだよ

性感染症の予防法は、まずはコンドーム

■ 性感染症の多くは、このような行為を通してうつります。

膣性交

膣にペニスを挿入するセックス

口腔性交
(オーラルセックス)

口や手を使ったセックス、
フェラチオ、クニリングスなど

肛門性交
(アナルセックス)

肛門にペニスを挿入するセックス

■ 性感染症を予防するには

1) コンドームなどで予防する

コンドームを使うのがいちばん現実的な性感染症予防ですが、正しく使わないと感染する危険性があります。また、口で行うオーラルセックスの場合も、コンドームを使わないと感染することがあります。なお、尖圭コンジローマを予防するワクチンも有効です。

2) セックスをしない

もっとも安全な予防法はセックスをしないことですが、現実には難しいと思います。そこで、感染していない特定のパートナーとしかセックスをしないのも一つの方法です。

